Bienvenido a Velphoro



Velphoro® (oxihidróxido sucroférrico) es un quelante de fosfato indicado para el control de los niveles de fósforo sérico en pacientes con enfermedad renal crónica que se realizan diálisis.

Cómo tomar Velphoro



ROMPA

0



0



MASTIQUE

TRITURE

Velphoro es fácil de romper, masticar o triturar.

No lo trague entero. Puede "romperlo y tomarlo" justo antes, durante o justo después de las comidas o los refrigerios. Tome siempre Velphoro con las comidas.

Si omite una dosis, tome su dosis habitual de Velphoro con su próxima comida.

Su dosis de Velphoro

TOME: _____

COMPRIMIDOS POR: COMIDA *O* **DÍA** (encierre en un círculo una opción)







Debido al alto poder de unión que tiene Velphoro, es probable que tenga que tomar menos comprimidos en comparación con otros quelantes de fosfato. La mayoría de las personas comienzan con 1 comprimido por comida. Con otros quelantes, podría necesitar tomar hasta 3 o 4 comprimidos con cada comida.

Consulte la Información importante de seguridad al dorso y la Información de prescripción completa adjunta.



chewable tablets

Consejos para ayudarlo a recordar que debe tomar Velphoro



Lleve siempre Velphoro con usted en un pastillero de Velphoro.



Guarde algunos comprimidos en lugares como el bolsillo del abrigo, cartera o mochila.*



Conserve Velphoro en la mesa de la cocina o la encimera.



Peque recordatorios en la puerta del refrigerador y la puerta principal.

*Mantenga el frasco o el pastillero de Velphoro bien cerrado. Guarde a temperatura ambiente y por debajo de los 87 °F (30.5 °C).



La mayoría de los efectos secundarios de **Velphoro** fueron leves. El más frecuente es diarrea, que generalmente desaparece por sí sola.

El hierro en Velphoro puede hacer que sus heces se vuelvan negras. Esto es perfectamente normal.

Si tiene preguntas, hable con su médico o proveedor de atención médica.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los comprimidos masticables Velphoro se deben tomar las comidas. Velphoro se debe masticar o triturar. No los trague enteros. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos de venta con receta y medicamentos de venta libre, vitaminas y otros suplementos. Velphoro puede interactuar con otros medicamentos.

Informe a su proveedor de atención médica si sufre de alguno de los siguientes: peritonitis (una infección) durante la diálisis peritoneal, trastornos hepáticos o gástricos significativos, cirugía gastrointestinal (GI) importante y reciente, antecedentes de hemocromatosis u otra enfermedad que tenga como resultado una acumulación de hierro en el cuerpo. Las personas con estas afecciones no fueron incluidas en los estudios clínicos con Velphoro, y su proveedor de atención médica supervisará sus niveles de hierro mientras esté tomando Velphoro.

Velphoro puede ocasionar efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son cambio de color de las heces, diarrea y náuseas. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparece.

Para reportar efectos secundarios negativos asociados con la administración de Velphoro, comuníquese con Fresenius Medical Care North America (FMCNA) al 1-800-323-5188. Se le recomienda informar los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o visitar www.fda.gov/medwatch.

Antes de tomar Velphoro, informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando.

Para obtener más información, vea la Información de prescripción completa visitando www.velphoro.com.



